

¿Cuál es su diagnóstico? Pregunta

Sección a cargo del Comité de Docencia e Investigación HNRG

Cecilia Guenzatti^a y Daiana Córdoba^a

Paciente de 9 años, con antecedente de obesidad, consulta por disminución de la agudeza visual y dolor a la movilización ocular de 48 horas de evolución, sin otros síntomas asociados. Es evaluada en el Servicio de Oftalmología, se realiza fondo de ojos y se evidencia edema bilateral de papila. Al examen físico presenta disminución de la agudeza visual bilateral, alteración de la visión de los colores, dolor a la movilización ocular derecha, midriasis arreactiva en el ojo derecho y reflejo fotomotor hipoactivo en el ojo izquierdo. Se realiza una resonancia magnética de cerebro y órbitas con contraste (imágenes 1, 2 y 3).

Imagen 1. Resonancia magnética cerebral, corte sagital T1.



Imagen 2. Resonancia magnética de cerebro y órbitas en corte axial (secuencia T1 contrastada con supresión de grasa)





Imagen 3. Resonancia magnética cerebral, corte axial T2



De acuerdo con la información proporcionada ¿Cuál es su diagnóstico?

- a. Hipertensión intracraneal idiopática
- b. Neuritis óptica
- c. Glioma de la vía óptica
- d. Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM)

a. Instructora de residentes de Clínica Pediátrica, HNRG

Contacto: instructoreshnr@gmail.com